

**Folgen**

Eine *Folge*  $a$  aus einer Menge  $M$  ist eine Abbildung  $a: \mathbb{N} \rightarrow M$ .

(Manchmal wird eine Folge auch als Abbildung  $a: \mathbb{N}_0 \rightarrow M$  definiert.)

*Beispiele:*

- (a)  $M = \mathbb{N}; a = (1, 3, 5, 7, \dots)$
- (b)  $M = \mathbb{Q}; a = (1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \dots)$
- (c)  $M = \mathbb{N}; a = (1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, \dots)$

**Vollständige Folgen**

Eine Folge natürlicher Zahlen wird *vollständig* genannt, wenn jede positive ganze Zahl als Summe von Folgegliedern dargestellt werden kann, in der jedes Folgeglied höchstens einmal vorkommt.

*Beispiele:*

- (a)  $a = (1, 2, 4, 8, 16, 32, \dots)$
- (b)  $a = (1, 3, 5, 7, 9, 11, \dots)$
- (c)  $a = (1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, \dots)$

**Der Satz von Zeckendorf**

Jede natürliche Zahl  $n > 0$  kann eindeutig als Summe voneinander verschiedener, nicht direkt aufeinanderfolgender Fibonacci-Zahlen  $f_i$  mit  $f_2 = 1, f_3 = 2, f_4 = 3, \dots$  dargestellt werden. Es gibt somit eine Darstellung der Form

$$n = \sum_{i=2}^k c_i f_i \quad \text{mit } c_i \in \{0, 1\}$$

*Beispiele:*

- (a)  $10 = 2 + 8 = f_3 + f_6 = 0 \cdot 1 + 1 \cdot 2 + 0 \cdot 3 + 0 \cdot 5 + 1 \cdot 8 \Rightarrow 01001$
- (b)  $19 = 1 + 5 + 13 = f_2 + f_5 + f_7$   
 $= 1 \cdot 1 + 0 \cdot 2 + 0 \cdot 3 + 1 \cdot 5 + 0 \cdot 8 + 1 \cdot 13$   
 $= 100101$

## Aufgabe 1

Bestimme die Zeckendorf-Darstellung der ersten 20 natürlichen Zahlen. Beachte, dass der grösste Summand ganz rechts steht.

$n$	Zeckendorf-Darstellung	$n$	Zeckendorf-Darstellung
1		11	
2		12	
3		13	
4		14	
5		15	
6		16	
7		17	
8		18	
9		19	
10		20	

## Alphabete, Wörter, Sprachen und Codes

Ein *Alphabet*  $\Sigma$  ist eine Menge von Zeichen.

Ein *Wort*  $w$  über einem Alphabet  $\Sigma$  ist eine Folge von Zeichen aus  $\Sigma$ .

Eine *Sprache*  $L$  ist eine Menge von Wörtern über einem Alphabet  $\Sigma$ .

Ein *Code*  $C$  ist eine Abbildung von einer Sprache  $L_1$  (über einem Alphabet  $\Sigma_1$ ) auf eine Sprache  $L_2$  (über einem Alphabet  $\Sigma_2$ ), die jedem Wort  $w_1 \in L_1$  umkehrbar eindeutig ein Wort  $w_2 \in L_2$  zuordnet. (Es ist auch möglich, dass  $\Sigma_1 = \Sigma_2$  oder sogar  $L_1 = L_2$  gilt.)

## Der Fibonacci-Kode

Da in der Zeckendorf-Darstellung ganz rechts immer die Ziffer Eins stehen muss (warum?), können wir durch Anhängen einer weiteren Eins auf der rechten Seite einen Code erzeugen bei dem wir die Codewörter ohne ein spezielles Trennzeichen verketteten können, obwohl sie unterschiedliche Länge haben. Dieser Code wird *Fibonacci-Kode* genannt.

*Beispiel:*  $7 \rightarrow 0101\mathbf{1}$

## Aufgabe 2

Welche natürlichen Zahlen werden durch die folgende Sequenz von Zeichen im Fibonacci-Kode dargestellt?

10101100011001001100101100010111000011